

ແມລັງດໍານະນາມຫຬວ



ກລຸ່ມວາຮກຫາພື້ນ
ສໍານັກງານເກະຕຽນຈັງແວດສີນເບຸຣີ



แมลงดำนาข้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dicladispa armigera* (Olivier)

วงศ์ : Chrysomelidae

อันดับ : Coleoptera



กสุ่มอารักขาพืช ส้านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

เป็นแมลงที่อยู่ในกลุ่ม “ด้วง”

រូបរាងលក្ខណៈ

ตัวเต็มวัย เป็นด้วงปีกแข็งสีดำ มี命名แข็งเหล้ม^ก ปีกคลุมตัวลำตัว ขนาดยาวประมาณ 5 - 6 มม.
ระยะตัวเต็มวัย 14 - 21 วัน

ระยะที่ แมลงดำนามเพศเมียวกะที่เป็นฟองเดียว ๆ ประมาณ 50 ฟอง ใกล้ปลายใบอ่อน ใต้ผิวใบ



ຕົກແຕ້

หนอง ลำตัวแบบสีขาว ตัวหนอนกินเนื้อเยื่อ
ภายในผิวใบข้าว เจริญเติบโตและเข้าดักแด้วยู่
ภายในใบข้าว ระยะหนอง 7 - 12 วัน




ວຈຈະສົວຕ



ระยะไข่ถึงระยะตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน

ลักษณะการทำลาย

- ตัวเต็มวัยกัดกินและผิวใบข้าวด้านบน ทำให้เห็นเป็นรอยขูดเป็นทางสีขาวยาวขนาดกับเส้นกลางใบ



ลักษณะการทำลาย

- ตัวหนอนจะชอบอยู่ใต้ผิวใบข้าว กัดกินเนื้อเยื่อส่วนลีเชี่ยวaway ในใบข้าวเห็นเป็นรอยแผ่นลีขุ่นมัวขนาดกับเล็บใน



ລັກສະນະກາຣທຳລາຍ



□ ນາບ້າວທີ່ຖືກທຳລາຍຮຸນແຮງໃບ
ປ້າວຈະແໜ້ງແລະກລາຍເປົ່ນສີ
ນໍ້າຕາລ່າເໜີ້ອນຖືກໄຟໄໝ້

ลักษณะการทำลาย

ใบข้าวจะแห้งและลายเป็นสีน้ำตาล
เหมือนถูกไฟไหม้



คำแนะนำในการป้องกันกำจัด

1. หมื่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
2. กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงนา เนื่องจากวัชพืชบางชนิดเป็นพืชอาศัยของแมลงดำชนิดข้าว
3. ไม่ใช้ปุ๋ยในไตรเจนมากเกินไป
4. อุบัติการณ์ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แทนเบียนไป Trichogramma spp. และแทนเบียนชนิดอ่อน Bracon sp.
5. หากพบจำนวนตัวเต็มวัยของแมลง达人ข้าวมากกว่า 2 ตัวต่อกรอ หรือกลุ่มข้าวควรใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ ฟีโพรนิล หรือ คลอไท์อะนิลีน อัตราตามฉลากแน่น้ำ

