



เตือนภัยระบาด

(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)

แมลงศัตรุ มะพร้าว

ไร้สีขา

เข้าทำลายใต้กลับข้าวผล
ตั้งแต่ผลเล็กทำให้เกิดแพล
ลุกสามารถเป็นแพลตากสะเก็ด
แต่ก็เป็นรังลายไม้สัน้ำตาล
และทำลายทุกผลในกล้าย

หากระบาดรุนแรงมะพร้าวจะช่วงก
การเจริญเติบโตผลจะร่วงได้



แมลงดำเนิน

ตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดกินยอดอ่อน
และซ่อนตัวในใบอ่อนที่ผับอยู่ ใจเดลื่อนย้าย
ไปกินยอดอ่อนอื่นหลังจากที่กินน้ำดื่มแล้ว
ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงในมะพร้าว
จะเป็นสีขาวโพลนชัดเจนหรือก่าชา
ชาวบ้านเรียกว่า “มะพร้าวหัวแห้ง”



ด้วงงวง

เข้าทำลายที่โคนต้น และยอด
ทำให้มะพร้าวยืนต้นตาย
โดยตัวเต็มวัยจะวางไข่ที่รอยแพลที่ด้วงแradเจาไว้
จุดสังเกตอาการรุนแรงที่แสดงต่ออยู่ด้วยเจา
เหี้ยวแห้ง ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหักพับ



ด้วงแรด

ตัวเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรุพืช
โดยบินขึ้นไปกัดกินใบและยอดอ่อน
ของมะพร้าวที่ใบยังไม่คลื่น ทำให้ใบใหม่ไม่สมบูรณ์
เมื่อใบคลื่นออกจะมีรอยขาดแหงง
เป็นริ้วๆ คล้ายรูปพัดหรือทางปลา



หนอนหัวดำ

หนอนหัวดำมะพร้าวชอบทำลายใบแก่
หากระบาดรุนแรง หนอนจะกัดกิน
ก้านใบ จั่น และผลมะพร้าว

หากการทำลายรุนแรงอาจทำให้ต้นมะพร้าวตายได้

