



การขยายพันธุ์ทุเรียน เสียนยอดด้านข้าง Side Grafting

Step 1 เลือกต้นทุเรียนพื้ในเมือง

ต้นต่อทุเรียนพื้ในเมืองในแปลง อายุ 8 เดือน ถึง 1 ปี กรีดเปลือกแนวขวางลำต้น 1 ซม. และกรีดเปลือกตามแนวความยาว 2 แนวจากรอยแนวขวาง ลอกเปลือกจากบนลงล่างยาว 1-2 นิ้ว



Step 2

เตรียมยอดทุเรียนพื้หน่อดี

เลือกยอดต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว มีตาที่โคนกิ่งพร้อม จะแตกยอด 3-4 ตา ตัดใบลดการคายน้ำ เจียนแผลที่จะประกบเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว 1-2 นิ้ว



ลอกเปลือกลำต้น
ทุเรียนพื้เมือง

Step 3 ประกบแผลกิ่งพื้หน่อดีกับต้นต่อ

กิ่งพื้หน่อขนาดเล็กกว่าต้นต่อ ให้สอดประกบรอยแผลกิ่งพื้หน่อ ชิดด้านใดด้านหนึ่งของต้นต่อ ปิดเปลือกต้นต่อทับกิ่งพื้หน่อให้สนิท

Step 4

เชื่อมต่อกิ่งพื้หน่อดีกับต้นต่อทุเรียนพื้เมือง

ใช้พลาสติกพันรอยแผลต้นต่อกับกิ่งพื้หน่อให้แน่น จากด้านล่างขึ้นด้านบน พันปิดยอดพื้หน่อให้หมด อาจพัน 2 ชั้น เพื่อกันน้ำจากภายนอกเข้ารอยแผล



FB : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

☎ 077-297710



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร





การขยายพันธุ์ทุเรียน เสียนยอดด้านข้าง Side Grafting

Step 5 ระยะเวลาการเชื่อมต่อรอยแผล

หาวัสดุพลาสติก เช่น ใบบัว กระดาษหนังสือพิมพ์ ปิดป้องกันแสงแดดไม่ให้มากกระทบกิ่งพันธุ์ดีมากเกินไป โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน สังเกตยอดใหม่จะแตกมาแทนยอดเก่า



ตัดต้นพื้นเมืองออก เพื่อเลี้ยงกิ่งพันธุ์ดี

Step 6 อนุบาลยอดพันธุ์ดี

เมื่อแผลเชื่อมกันสนิท ให้บากเปลือกต้นตอรอบต้นเพื่อตัดทางเดินที่อาหารเหนือกิ่งพันธุ์ดี เพื่อให้ยอดกิ่งพันธุ์ดีเจริญเติบโตได้เต็มที่ โดยใช้ยอดต้นตอเป็นร่มเงา เมื่อกิ่งพันธุ์ดีแข็งแรงจึงตัดยอดต้นตอออก พร้อมหาไม้ดามกิ่งพันธุ์ดี เสริมความแข็งแรง



ข้อดี - ข้อเสีย

ข้อดี : ระบบรากแข็งแรง ได้ต้นสายพันธุ์ดี ตรงตามความต้องการ

ข้อเสีย : ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชำนาญ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการปฏิบัติงาน



FB : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

☎ 077-297710



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

