

แมลงศัตรูมะพร้าว

แมลงดำหนามมะพร้าว

ลักษณะการเข้าทำลาย

ตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดกินยอดอ่อน และจะซ่อนตัวอยู่ในใบอ่อนที่พับอยู่ โดยจะเคลื่อนย้ายไปกินยอดอื่นต่อเมื่อใบของมะพร้าวที่ซ่อนตัวคลีออกมา ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายอย่างรุนแรง ใบจะเป็นสีขาวโพลนชัดเจน หรือที่เรียกว่า "มะพร้าวหัวหงอก"

การป้องกันกำจัด

1. ปลอ่ยแมลงหางหนีบสีดำ อัตรา 80 ตัวต่อไร่
2. ปลอ่ยแตนเบียน *Tretrastichus brontispae* อัตรา 5 - 10 มัมมีต่อไร่ จำนวน 3 - 5 ครั้ง
3. หากระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง
 - 📌 มะพร้าวมีความสูงต่ำกว่า 12 เมตร
กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด 70% WG 4 กรัม ละลายน้ำ 1 ลิตรต่อต้น ระบาดบริเวณยอดมะพร้าว และรอบคอมมะพร้าว
 - 📌 มะพร้าวมีความสูงมากกว่า 12 เมตร
กลุ่ม 6 อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC ฉีดเข้าต้นมะพร้าว อัตรา 50 มล.ต่อต้น

ดักแด้

กลุ่มไข่