

# ช่วงรอยต่อฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว เราสามารถแยกขยายรังชันโรง ได้ไหม ?



ในแถบภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน เกษตรกรที่เลี้ยงชันโรงหลาย ๆ ฟาร์ม มักนิยมทำการแยกขยายรังชันโรงกันมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือน ก.พ. ไปจนถึงเดือน พ.ค. เพราะเป็นช่วงที่มีพืชอาหารอุดมสมบูรณ์ สำหรับแมลงจำพวกผึ้ง ที่ให้ทั้งเกสร น้ำหวาน เพื่อนำมาเลี้ยงดูตัวอ่อน และสะสมเป็นจำนวนมากภายในรังในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด ในการแยกขยายรัง พร้อมกับการเก็บผลผลิตน้ำผึ้งชันโรง อัญมณีสีอำพันที่ล้ำค่า ที่เจ้าผึ้งชันโรงตัวน้อยบรรจงรังสรรค์ เก็บเล็กผสมน้อย เพื่อไว้ใช้ ยามฉุกเฉินเมื่อขาดแคลนอาหาร และตอบแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงที่คอยดูแลพวกเขาให้ปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตราย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ จะเลือกเก็บก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเพราะเป็นช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ต่ำ น้ำผึ้งที่เก็บช่วงนี้จึงเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดใน

แล้วเมื่อถามว่า ช่วงรอยต่อฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว เราสามารถแยกขยายรังชันโรง ได้ไหมนะ ? ตอบได้เลยว่าได้ครับ แต่เราจะเลือกทำการแยก ขยายเฉพาะรังที่มีความสมบูรณ์เท่านั้น รังสมบูรณ์ เป็นอย่างไรละ รังสมบูรณ์คือรังที่มีกลุ่มไขหนาแน่นพองตัวไม่เหี่ยว มีทั้งสีเข้มและมีอ่อน คือมีทั้งไขแก่และไขอ่อนนั่นเอง นอกจากนั้นแล้ว ภายในรังต้องมีการสะสมอาหารพอสมควรทั้งเกสรและน้ำหวานหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีไขแก่ของนางพญา ภายในรังที่จะทำการแยกด้วย หรือหากไม่สามารถนำไขนางพญาชนิดเดียวกันจากรังอื่นมาใส่ก็ได้ เช่นกัน แต่ในกรณีเกษตรกรที่สามารถเพาะเลี้ยงนางพญาได้ก็สามารถใส่นางพญาชันโรงพรหมจรรย์เข้าไปเพื่อให้ไปผสมพันธุ์เป็นนางพญาแม่รัง ก็ได้ครับ แต่การแยกในช่วงนี้ไม่ควรเก็บน้ำผึ้งมาด้วย รอเก็บช่วงฤดูร้อนดีกว่าครับ ดังนั้นแล้วทุกคนคงได้คำตอบแล้วนะครับ

เกล็ดสาระความรู้โดย นายปวิวรรต ปัญจะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่



ติดต่อหน่วยงาน  
โทร. 052001152  
E-mail : aopdb04@doae.go.th

ภาพและข่าว  
นางสาวเอื้องชัน ไชยธง/  
ทีมงานศูนย์ผึ้งเชียงใหม่

