



เตือนการระบาด

(วันที่ 20 ธันวาคม 2566)

โรคพืช ที่มาพร้อม อากาศหนาว

โรคราแป้ง

พบเชื้อราคล้ายผงแป้งสีขาวเกิดเป็นหย่อมๆ บนใบ มักพบที่ใบส่วนล่าง หากพบการระบาดรุนแรง ใบจะค่อยๆ ชิดเหลืองและแห้ง ถ้าพืชเป็นโรค

ในระยะติดผลอ่อนจะทำให้ผลแก่รีน บิดเบี้ยว ผิดรูขรุขระ เป็นตุ่ม หรือแผลที่เปลือก

แนวทางการป้องกันกำจัด

- ✓ หมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี
 - ✓ ตรวจสอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคเริ่มระบาด
- พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ทีบูโคนาโซล ไตรฟลอกซีสโตรบิน เพนทีโอไพแรด พ่นทุก 5 - 7 วัน
- ✓ แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรเก็บซากพืชไปทำลาย นอกแปลงปลูก



โรคราสนิม

ด้านบนใบเป็นจุดสีเหลืองอ่อน เมื่อพลิกดูด้านหลังใบจะเป็นตุ่มแผลนูนมีผงสีขาวอมเหลือง และสีเทา ใบมีลักษณะพองหรือบิดเบี้ยว ถ้าเป็นกับดอกตูมจะทำให้กลีบเลี้ยงและกลีบดอกแห้ง ไม่คลี่บาน

แนวทางการป้องกันกำจัด

- ✓ ไม่ปลูกพืชจนแน่นเกินไป
- ✓ กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดการเกิดโรค
- ✓ เมื่อเริ่มพบโรค พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คลอโรทาโลนิล แมนโคเซบ ไตรอะดีมีฟอน อะซอกซิสโตรบิน ไดฟีโนโคนาโซล ทุก 7 วัน



โรคน้ำค่าง

พบได้บ่อยในกลุ่มพืชตระกูลแตง และพืชตระกูลกะหล่ำ

ลักษณะอาการ : เกิดแผลสีเหลืองบนใบ แผลมีลักษณะเป็นเหลี่ยมตามแนวเส้นใบ หากระบาดรุนแรงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแห้งตายทั้งต้น

แนวทางการป้องกันกำจัด

- ✓ ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา
- ✓ ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป เพราะจะทำให้มีความชื้นสูง
- ✓ หมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศใน แปลงได้ดี และทำลายแหล่งอาศัยของตัวง่เต่าแตง
- ✓ หมั่นตรวจสอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคเริ่มระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไดเมโทมอร์ฟ แมนโคเซบ เมทาแลกซิล พ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ ทุก 5 - 7 วัน

