



เตือนการระบาด

(วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ใบด่างจุดวงแหวน

ในมะละกอ

โรคใบด่างจุดวงแหวน สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมะละกอ

พืชอาศัยของเชื้อไวรัสชนิดนี้ : แตงป่า ผักแพง บวบ ตำลึง แตงต่าง ๆ

แมลงพาหะ : แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยอ่อนฝ้าย
เพลี้ยอ่อนแก้ว แมลงหวี่ขาว



ลักษณะอาการ

ใบด่างเหลืองหรือใบด่างสีเขียวเข้ม สลับสีเขียวอ่อน ใบมีขนาดเล็กลง บิดเบี้ยว เนื้อใบหดหายจนเหลือง แต่เส้นใบทำให้มีลักษณะเป็นเส้นบนก้านใบ และลำต้นมีลักษณะเป็นจุดช้ำน้ำหรือเป็นทางยาวสีเขียวเข้ม ต้นแคระแกร็นใบแก่ร่วงหมดจนเหลือแต่ใบยอด ผิวของผลมะละกอเกิดแผลจุดกลมเป็นวงซ้อนๆ กันกระจายทั่วทั้งผล มะละกอที่รับเชื้อตั้งแต่ระยะต้นอ่อน มักไม่ติดผล

****เชื้อไวรัสสาเหตุโรคที่ยังไม่มีสารป้องกันกำจัดได้โดยตรง**

ป้องกันการระบาดของโรค

- ✓ กำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ
- ✓ กำจัดเพลี้ยอ่อนที่เป็นแมลงพาหะ ฟันด้วยสารอิมิดาโคลพริด สารไทอะมีทอกแซม สารไดโนทีฟูแรน สารโคลโทอะนิติน
- ✓ หากพบต้นที่เป็นโรค ให้เกษตรกรรีบถอนหรือขุดนำเอาต้นที่เป็นโรคออกจากแปลง
- ✓ ทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้ง