

แมลงศัตรูมะพร้าว

โรสี้ขามะพร้าว

ลักษณะการเข้าทำลาย

เข้าทำลายใต้กสิบข้าวผล และใต้กสิบเลี้ยงทำให้เกิดรอยแผลที่ข้าวผลและลูกลามลงมาที่ผลทำให้แผลตกละเอียด เมื่อผลโตขึ้นจะเห็นแผลเป็นร่องลึก เมื่อแกะข้าวผลออกจะเห็นด้านในเป็นสีน้ำตาล หากนำไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นโรสี้ขามะพร้าวตัวเล็ก ๆ จำนวนมาก โดยจะเข้าทำลายเกือบทุกผลของทลายมะพร้าว

การป้องกันกำจัด

1.

พ่นสารกำจัดโรในช่วงระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดใหญ่ ห่างกัน 1 สัปดาห์ กลุ่มสารที่แนะนำ

- กลุ่ม 12 โพรพาไคต์ 30% WP อัตรา 30 กรัม
- กลุ่ม 19 อามีทราซ 20% EC อัตรา 40 ซีซี
- กลุ่ม 21 ไพริดาเบน 20% WP อัตรา 15 กรัม
- กลุ่ม 23 สไปโรมีซิเฟน 24% EC อัตรา 6 มล.
- กลุ่ม 10A เฮกซีโทอะซอกส์ 1.8% EC อัตรา 30 มล.
- กลุ่ม 25 ไซฟลูมีโทเฟน 20% SC อัตรา 10 มล.
- กลุ่ม 21 ทีบูเฟนไพเรด 36% EC อัตรา 3 มล.

เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้สลักกลุ่มสารในการฉีดพ่นทุก 2 ครั้ง

3. ถ้าโรสี้ขาเข้าทำลายในข้าวผลแล้ว เมื่อพ่นสารตัวสารจะไม่สามารถฆ่าไรได้โดยตรง