

3 ศัตรูตัวลิสง

ควรระวังในพื้นที่ที่มีอากาศแห้ง



1

เพลี้ยจักจั่น

มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน้ำเลี้ยงใต้ใบ ทำให้ใบห่อลง หักงอ และใบไหม้ หากระบาดรุนแรง ใบจะร่วงทั้งต้น

ป้องกันและกำจัด พ่นสารคาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตราตามคำแนะนำ

หนอนบ้วนใบ

หนอนกัดกินผิวใบ หรือชกใยดึงเอาใบหลายๆ ใบมาห่อรวมกัน และอาศัยกัดกินอยู่ในใบจนหมด

ป้องกันและกำจัด หากพบใบถูกทำลาย 30 % พ่นสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC หรือสารไตรอะโซฟอส 40% EC หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตราตามคำแนะนำ



2



3

หนอนกระทู้ผัก

ตัวอ่อนรวมกลุ่มกัดแทะผิวใบด้านล่าง ทำให้มองเห็นใบโปร่งใสคล้ายร่างแห เมื่อหนอนโตจะแยกกลุ่มออกไปกัดกินใบทั่วทั้งแปลง

ป้องกันและกำจัด พ่นเชื้อไวรัส NPV กรณีพบใบถูกทำลาย 30% พ่นสารแลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% EC หรือสารไตรอะโซฟอส 40% EC หรือคลอร์ฟลูอาซูรอน 5% EC อัตราตามคำแนะนำ

