



เตือนภัยระบาด

(18 มกราคม 2567)

ศัตรุพืชตัวร้าย... ในนาข้าว

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะถูกกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้นตันข้าวจะแสดงอาการใบเหลืองแห้งคล้ายถูกน้ำร้อนลงซึ่งเรียกว่า "อาการใหม่เป็นหย่อม" ถ้ารุนแรงตันข้าวจะแห้งตายและเป็นพาหะเชื้อไวรัส "โรคใบหวัดหรือโรคจู" ข้าวอักด้วย



เพลี้ยจกจันสีเขียว

กำลายข้าวได้ 2 ทาก คือ กำลายตรงและกำวยอ่อน การกำลายกำยตรงคือ ถูกกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าวซึ่งต้านทานปริมาณเมล็ดมาก สภาพแวดล้อมเหมาะสมและชาวนาปลูกพันธุ์ไม่ด้านทาน ข้าวจะถูกกำลายเหี่ยวแห้งตายการกำลายกำยอ่อน คือ เป็นพาหะนำ "โรคใบสัน" สรุตันข้าว ข้าวที่เป็นโรคผลผลิตจะลดลงมาก



เพลี้ยจกจันปีกลายหยัก

กับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยถูกกินน้ำเลี้ยงจากใบและก้าน ข้าวที่ถูกทำลายปล้ำในจะแห้งและขอบใบเปลี่ยนเป็นสีล้มห่วงงอ และเป็นพาหะนำโรคใบสันและโรคหุดมาสู่ตันข้าว พบรอบร่องรอยในตุ่นนำไปมากกว่านาปรุง



เข้ากำลายที่ยอดอ่อนของตันข้าว แต่น้ำข้าวจะสร้างหลอดหุ้มตัวเมล็ด และเจริญออกมานอกหุ้มตัวเมล็ด ใบหุ้ม แกนที่จะเจริญเป็นใบตามปกติ ตันที่เป็นหลอดจะไม่ออกรวง เมื่อตันข้าวถูกทำลาย ข้าวจะแตกกอนมากดแทน หากมีการระบาดมากข้าวจะแตกกอนมากผิดปกติ คลายกอตະไคร้ ตันจะเดี้ยดตาระบาดรุนแรงข้าวอาจไม้ออกรวงเลย



มวนเขียวข้าว

เพลี้ยไฟกับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะถูกกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าว ที่ยังอ่อนโดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ ข้าวโดยถูกทำลายปล้ำใน จะเหี่ยวขอบใบจะมวนเข้าหากกันไปและอาศัยอยู่ในใบที่มวนนั้น พบทำลายข้าวในระยะกล้าหรือหลังปักดำ โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนตกช่วง ตาระบาดมากๆ ทำให้ตันข้าวแห้วตายกับเปลว



เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟกับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะถูกกินน้ำเลี้ยงจากใบข้าว ที่ยังอ่อนโดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ ข้าวโดยถูกทำลายปล้ำใน จะเหี่ยวขอบใบจะมวนเข้าหากกันไปและอาศัยอยู่ในใบที่มวนนั้น พบรอบร่องรอยในระยะกล้าหรือหลังปักดำ โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนตกช่วง ตาระบาดมากๆ ทำให้ตันข้าวแห้วตายกับเปลว

แมลงสิง

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ใช้ปากแท้งถูกกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าว ระยะเป็นน้ำนม แต่ก็สามารถถูกกินเมล็ดข้าวที่มีเมล็ดอ่อนและเมล็ดแข็ง โดยตัวเต็มวัยจะทำความเสียหายมากกว่า เพราะถูกกินเป็นเวลานานกว่า ทำให้เมล็ดลับผลผลิตข้าวลดลง



หนอนกระถูกกล้า

กำลายข้าวในระยะกล้าอย่างรวดเร็ว มีการเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่ม หนอนระยะแรก กัดกินผิวใบ เมื่อตัวโตขึ้นกัดกินต้นกล้าในเวลากลางคืน เหลือไว้แต่ก้านใบ โผล่อยู่เท่านั้น และจะกัดกินลำต้นกล้าระดับพื้นดิน ความเสียหายที่ก้าวหน้าอาจเกิดขึ้นภายใน 1 - 2 วัน เท่านั้น



หนอนกอข้าว

เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินภายในใบและลำต้น ตรงส่วนที่เป็นก้อนน้ำก่ออาหารในระยะแรก ก่อให้ใบข้าวมีอาการ "ยอดเหี่ยว" การกำลายที่เกิดขึ้น ก่อนระยะแรกกอเต็มที่ ตันข้าวที่สามารถสร้างหน่อใหม่ขึ้นมากดแทนได้ ต้ากำลายในระยะอกรวง จะทำให้รวงแห้ง มีสีขาวและเมล็ดลับกับรวงเรียกว่า "ข้าวหัวแห้ง"

หนอนห่อใบข้าว

ตัวหนอนจะเอามาในข้าวห่อหุ้มตัวคล้ายหลอด แล้วกัดกินใบอยู่ภายในนั้น ทำให้ใบรีเวน ที่ถูกกัดกิน ข้าวใส่เป็นกาวขาว ความขาวของรอยที่ถูกกัดกินประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ปกติจะพบตัวหนอนกัดกินอยู่ภายในนั้นเพียงตัวเดียว ผลของการที่ใบถูกทำลายนั้น ทำให้ประสิทธิภาพในการสั่งเคราะห์แสงลดลง