



เผ่าระวัง แมลงได้ตรงตัวเหลือ๑๑

สภาพอากาศในช่วงนี้มีอากาศเย็นตอนเช้า และตอนกลางวัน กลางวันมีอากาศร้อน เกษตรกรควรระวังแมลงวัน หนอนกระทู้ผัก ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น

เช้าทำลายตั้งแต่ตัวหนอนระยะเจริญเติบโตทางลำต้น และใบ จนถึงระยะออกดอกและติดฝัก หนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เกาะผิวใบด้านล่าง ทำให้เหลือแต่เส้นใบ เมื่อผิวใบแห้งจะมองเห็นเป็นสีขาว และเมื่อหนอนโตขึ้น จะแยกกลุ่มออกไปกัดกินใบทั่วทั้งแปลง โดยหนอนจะกัดกินจากขอบใบเข้าไป



การป้องกันกำจัด

- พ่นเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผัก อัตราการใช้ 50 มิลลิลิตรต่อไร่ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง **เมื่อพบการระบาด**
- พ่นด้วยสารกำจัดแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตราการใช้ 10 มิลลิลิตรต่อไร่ 20 ลิตร
- พ่นด้วยสารกำจัดแมลง ไตรอะโซฟอส 40% EC อัตราการใช้ 40 มิลลิลิตรต่อไร่ 20 ลิตร
- พ่นด้วยสารกำจัดแมลง คลอร์ฟลูอาซูรอน 5% EC อัตราการใช้ 20 มิลลิลิตรต่อไร่ 20 ลิตร พ่นเมื่อใบถูกทำลาย 30 % ในระยะก่อนออกดอก



ที่มาข้อมูล : สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ภาพ : วรชานู โดภะพันธ์ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร