



เตือนการระบาด

(25 มกราคม 2567)



เพลี้ยจักจั่น

มะม่วง

“ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณช่อดอก ทำให้ดอกแห้ง ร่วง และไม่ติดผล ”

เพลี้ยจักจั่นจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำเหนียว ๆ คล้ายน้ำหวานติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆ ทรงพุ่ม ทำให้มะม่วงเปียกเยิ้ม ต่อมจะถูกปกคลุมโดย เชื้อราดำ ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสง



แนวทางการป้องกันกำจัด

- ✓ การตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บผลผลิต ช่วยลดที่หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั่น
- ✓ พ่นด้วยสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไดโนทีฟูแรน อิมิดาโคลพรีด ไพมีโทรซีน บูโพรเฟซิน ไทอะมีทอกแซม อะซีทามีพรีด
- ✖ ✖ เมื่อช่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร และหมั่นตรวจดูตามช่อดอกอยู่เรื่อยๆ
- ✓ ใช้น้ำฉีดล้างช่อดอกและใบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากโรคราได้บ้าง ถ้าแรงอัดฉีดของน้ำแรงพอ ก็ช่วยให้เพลี้ยจักจั่นมะม่วงในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้ ต้องระมัดระวังอย่าให้กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะอาจทำให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้
- ✓ ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ

