



เตือนการระบาด

(16 กุมภาพันธ์ 2567)

โรคไหม้ข้าว

สาเหตุ : เชื้อรา *Pyricularia oryzae*.

ระยะกล้า

ใบมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล หากพบการระบาดของ โรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งพับตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้



ระยะแตกกอ

พบอาการได้ทั้งใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า ใบจะมีลักษณะแผลซ้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ



ระยะออกรวง

หากพบเชื้อราเข้าทำลายในช่วงข้าวเริ่มออกรวง เมล็ดจะลีบ หากพบเชื้อราเข้าทำลายระยะใกล้เก็บเกี่ยว จะพบรอยแผลซ้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่ายรวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก



การป้องกันกำจัด

- ✓ คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกาไมซิน คาร์เบนดาซิม โพรคลอราซตามอัตราที่ระบุ
- ✓ หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่
- ✓ จัดการแปลงให้อากาศถ่ายเทได้ ✗ ไม่ควรใส่ปุ๋ยในโตรเจนสูงเกินไป ✗
- ✓ หากพบการระบาดหรือรอยแผลเฉลี่ย 2-3 แผล/ใบ ฉีดพ่นด้วยสารกำจัดเชื้อรา หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นในอัตรา 1 กก : น้ำ 100 ลิตร