




# เฝ้าระวังจักจั่นอ้อย

## ในเขตพื้นที่ชายฝั่งปรังถาน

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตชลประทาน โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สระบุรี และจังหวัดลพบุรี

สำรวจแบบทแยงมุม จำนวน 10 จุด/แปลง

สำรวจแปลงอ้อยช่วงระยะงอกจนถึงระยะย่างปล้อง หรือตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม เป็นช่วงที่ตัวเต็มวัยออกผสมพันธุ์และวางไข่ โดยจักจั่นเพศผู้ใช้อวัยวะทำเสียงเรียกหาคู่



✕ จุดสำรวจ ↔ แนวการเก็บข้อมูลระยะ: 1 เมตร

## ข้อสังเกต

### ระยะงอก - ระยะแตกกอ



รูขนาด 1 - 2 ซม.  
บริเวณรอบกออ้อย

#### การจัดการ :

ขุดบริเวณพบรูของจักจั่น เพื่อจับตัวอ่อนในดิน

### ระยะแตกกอ - ระยะย่างปล้อง



คราบและตัวเต็มวัยจักจั่น

#### การจัดการ :

> ใช้กับดักแสงไฟหรือสวิงโลบ จับตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน  
> ใช้สารพินโบคาร์บ พ่นกำจัด ตัวเต็มวัย



เส้นกลางใบแดง และมีจุด ๆ เรียงเป็นแนว

#### การจัดการ :

> ตัดใบที่พบไข่ทิ้ง แล้วนำไปเผาทำลาย  
> ปลอ่ยแมลงหางหนีบ 500 ตัวต่อไร่