



หนอนปลอกกล้วย

The Case Caterpillar



หนอนปลอกกล้วยจะแทะผิวใบ ทำให้ใบแห้งเป็นสีน้ำตาล และกัดทะลุใบเป็นรูขาดแหว่ง ถ้าเข้าทำลายรุนแรงจะเห็นทางใบทั้งต้นเป็นสีน้ำตาลแห้ง ต้นชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลง หรือไม่ได้ผลผลิต

ตัวเต็มวัยหนอนปลอกกล้วยเป็นผีเสื้อกลางคืน ระยะหนอนเป็นระยะที่ทำให้เกิดความเสียหาย โดยหนอนจะเริ่มแทะผิวใบมะพร้าว หรือใบปาล์มน้ำมันผสมกับใยที่ขับออกมาจากปากนำมาสร้างปลอกห่อหุ้มตัวเอง ปลอกมีช่องเปิด 2 ทาง ช่องเปิดด้านบนสำหรับโผล่หัวออกมาแทะกินใบพืช ส่วนด้านล่างสำหรับเป็นช่องขับถ่าย ระยะหนอนใช้เวลาประมาณ 92 - 124 วัน การแพร่กระจายโดยลม



การป้องกัน/กำจัด

1

หมั่นสำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

2

ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่พบการทำลาย นำไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์

3

พ่นด้วยเชื้อบีที (*Bacillus thuringiensis*) ผสมสารจับใบ

4

พ่นด้วยสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง

1) ฟลูเบนไดโอะไมด์ 20% WG

2) คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC

3) ลูเฟนนูรอน 5% EC (สารกลุ่ม 15)

