

“ มันสำปะหลังส่วนยอดแคระแกร็น มีการแตกตาข้างมาก ยอดเป็นพุ่ม ใบเล็กลวสีเหลืองซีด และมีใบแห้งติดกิ่งหรือร่วงหล่น ต่อมากิ่งก้านจะแห้งตายจากยอด ลำต้นแคระแกร็น ท่ออาหารใต้เปลือกลำต้นหรือหิวเปลี่ยนเป็นเส้นสีน้ำตาลดำ ”

# พุ่มแฉ่

สาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา

## ใน มันสำปะหลัง



ดอกสาบม่วง

ดอกสาบม่วงที่เป็นโรคพุ่มแฉ่

เพลี้ยจักจั่นพาหะนำโรคพุ่มแฉ่

**i** ที่มาข้อมูล : กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร  
จัดทำโดย : นางสาวศิริวรรณ ดียิ่ง  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มอารักขาพืช  
ปราจีนบุรี

### การป้องกันกำจัด



- 1** ใช้ก่อนพันธุ์ปลอดโรค
- 2** หากพบอาการหลังปลูก :  
**1 เดือน** ให้ถอนต้นที่แตกยอดพุ่ม ผิดปกติทิ้ง  
**4 เดือน** ให้ตัด/หักกิ่งก้านต่ำจากบริเวณ ยอดพุ่ม ประมาณ 30 ซม. ทิ้ง
- 3** ให้น้ำ ปุ๋ย และปรับปรุงดินเพื่อบำรุงต้น มันสำปะหลังให้แข็งแรง
- 4** พ่นสารกำจัดเพลี้ยจักจั่น ซึ่งเป็นแมลงพาหะนำโรค
- 5** กำจัดวัชพืชในแปลง โดยเฉพาะต้นสาบม่วง

