



# เตือนการระบาด

(28 มีนาคม 2567)

# โรคพุ่มแจ้ มันสำปะหลัง

## สาเหตุ : เชื้อไฟโตพลาสมา

### ลักษณะอาการ

ระยะ 1-2 เดือน



แตกยอดมาก  
ข้อปล้องสั้น  
ใบมีขนาดเล็กลง

ระยะ 4-5 เดือน



ต้นแคระแกร็น  
แตกยอดพุ่มพวย

ระยะใกล้เก็บเกี่ยว



เชื้อลงหัวพบเส้นใย  
สีดำใต้เปลือก  
เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ

### การแพร่ระบาด

ก่อนพันธุ์ที่เป็นโรค



เพลี้ยจักจั่น



### การป้องกันกำจัด

- ✓ ใช้ก่อนพันธุ์จากแปลงปลอดโรค
- ✓ **ระยะ 1** เดือน พบต้นเป็นโรคให้ถอนทำลาย
- ✓ **ระยะ 4** เดือนหากพบโรคให้หักกิ่งที่เป็นโรคทำลาย
- ✓ พันสารกำจัดเพลี้ยจักจั่น แมลงพาหะ
- ✓ กำจัดวัชพืชโดยเฉพาะ “ต้นสาบม่วง” แหล่งอาศัยเชื้อสาเหตุ
- ✓ บำรุงต้นมันสำปะหลังให้แข็งแรง



056-476720



เกษตรชัยนาท



สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

ที่มา :กรมวิชาการเกษตร